

Skärpta hygienrutiner i förskolan

Gäller vid en ökning av infektioner, t.ex. magsjuka och streptokockinfektioner.

För att bryta smittspridningen har förskolan beslutat att vidta följande åtgärder. Rutinerna kommer att gälla tom en vecka efter det att den siste personen har tillfrisknat.

Handhygien

- Händerna tvättas ofta och framförallt efter toalettbesök/blöjbyte och före måltid. Händerna torkas torra med engångshandduk. Alla textilhanddukar plockas bort
- Handsprit rekommenderas efter varje blöjbyte och toalettbesök gäller både barn och personal
- Handsprit rekommenderas även före alla måltider för både barn och personal
- Engångshandskar skall användas vid blöjbyten och toalettbesök när barnet har bajsat
- Håll naglarna korta

Blöjbyte

- Använd enbart engångsunderlägg direkt på den galonförsedda dynan på skötbordet. Pappersunderlägget byts mellan varje barn
- Torka av dynan med alkoholbaserad ytdesinfektion efter varje blöjbyte
- Använd engångshandskar
- Bajsblöjan läggs i en plastpåse som knyts ihop och kastas direkt
- Plastförkläde av engångstyp används vid blöjbyte när barnet har diarré
- Skötbordet inkl tvättho rengörs med engångstrasa/textiltrasa och rengöringsmedel dagligen. Textiltrasan läggs i tvätt direkt efter användning

Mathantering

- Sträva efter att så få personer som möjligt hanterar mat
- Använd rent förkläde vid all mathantering
- Endast friska personer dukar och hanterar mat
- Den som vårdar magsjuk anhörig hemma skall inte hantera livsmedel förrän 48 timmar efter anhörigs sista symtom
- Ingen buffé eller självservering under utbrottet
- Duka endast fram så mycket smör och så mycket pålägg som förväntas gå åt vid måltiden
- All överbliven mat kastas
- Matbordet avtorkas med engångstrasa alternativt ren disktrasa före måltid

Rengöring/tvätt

- Håll tvättställ, kranar, toaletsits och spolknopp rena. Kan med fördel torkas av med ytdesinfektion
- Pottor rengörs med rengöringsmedel torkas ur och ytdesinficeras direkt efter användning
- Avdelningen städas grundligt dagligen, målinriktad städning som toaletter, kontaktytor, lektyor
- Rengör leksaker
- Alla textilier tvättas som örngott, madrassöverdrag, kuddar, mjukisdjur vid minst 60 grader
- Uppmana föräldrar att byta/koka nappar och tandborstar. Vid eventuell antibiotikabehandling bör dessa bytas innan behandlingen är avslutad
- Plastförkläde av engångstyp används om barnet har kräkts eller har diarré

Punktdeinfektion

Vid spill av kroppsvätskor som avföring och kräkning rengörs ytorna med

- Alkoholbaserad ytdesinfektion vid mindre spill
- Virkon 1 % vid större spill

Övrigt

- Barnen bör vara ute så mycket som möjligt. Vädra 2-3 gånger dagligen.
- Undvik aktiviteter mellan avdelningarna
- Undvik lek med modellera som används flera gånger
- Undvik vattenlek i gemensam badbalja